

**Соликокс®**  
раствор для орального применения

- Соликокс® действует на все виды кокцидий у птиц, свиней, кролей, крупного и мелкого рогатого скота.
- Его противококцидиозная активность выше, чем у любого другого современного кокцидиостатика.
- Соликокс® – малотоксичный препарат. Многократная передозировка не приводит к отравлению.
- Соликокс® сочетается с любыми другими ветеринарными препаратами. Его можно применять в условиях повышенной температуры и влажности, в условиях теплового стресса.

### **Описание**

Прозрачный раствор.

### **Состав**

1 мл препарата Соликокс® содержит действующее вещество:

диклазурил - 2,5 мг;

вспомогательные и формообразующие вещества – до 1 мл.

### **Фармакологические свойства**

Диклазурил, который входит в состав препарата Соликокс®, относится к малотоксичным веществам. Он действует на все виды кокцидий у птиц (*Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mitis*, *E. necatris*, *E. tenella*, *E. adenoeides*, *E. gallopavonis*, *E. meleagrimitis* и др.), кролей (*E. flavesrens*, *E. intestinalis*, *E. magna*, *E. perforans*, *E. stiedai* и др.), крупного и мелкого рогатого скота, свиней (*Isospora suis*). Наиболее чувствительные к препарату неполовые стадии эндогенного цикла развития кокцидий. Диклазурил не вызывает отрицательных последствий даже при превышении рекомендованных доз в 25-50 раз. Препарат не обладает мутагенным, канцерогенным и тератогенным действиями, его можно применять с любыми кормовыми добавками, антибиотиками, кокцидиостатиками. Препарат термостабильный, эффективный в очень маленьких дозах, не накапливается в органах и тканях животных.

### **Применение**

Лечение кокцидиозов у птицы, кролей, телят, ягнят, козлят, свиней.

### **Дозирование**

**Птица:** 0,4 мл на 1 кг массы тела, что приблизительно соответствует 2 мл на 1 л питьевой воды в сутки на протяжении 2 суток. Соликокс® задают в нерастворенном виде через медикатор, или растворяют водой в соотношении не менее 10 л воды на 1 л Соликокса®; **Кроли, телята, ягнята, козлята:** 0,4 мл на 1 кг массы тела в сутки с питьевой водой на протяжении 2 суток, что соответствует 1 мг действующего вещества на 1 кг массы тела в сутки. Соликокс® задают в нерастворенном виде или растворяют водой в соотношении не менее 10 л воды на 1 л Соликокса;

**Поросыта:** 2 мл на 1 кг массы тела непосредственно через рот однократно.

### **Противопоказания**

Индивидуальная непереносимость.

### **Предостережения**

Препарат с водой необходимо задавать не менее 12 часов в сутки. При растворении препарата Соликокс® в воде необходимо препарат добавлять в воду, а не наоборот.

### **Период ожидания (каренция)**

Пять суток.

### **Форма выпуска**

Упаковка, содержащая 10 полиэтиленовых флаконов по 10 мл и полиэтиленовые флаконы по 1000 мл.

### **Хранение**

Препарат Соликокс® хранят в транспортной таре, в крытых складских помещениях, в темном, сухом месте при температуре от +5 до +25°C. Срок годности – 2 года.